

בדיקות קולונוסקופיה - דרכי העיכול התחתונות

(הכנה לבדיקה עם פיקו-סלקס - PICOSALAX – בוקר)

ביצוע הבדיקה בין השעות: 07:00-14:00

זמן הגעה לבדיקה:

מטופל/ת יקר/ה,

ברור בווך למכון הגסטרו. ברצוננו להדריך אותך בבדיקה הקולונוסקופיה שתואמה לך.

מהי בדיקת קולונוסקופיה:

בדיקה קולונוסקופיה מאפשרת הסתכלות לתוך חלל מעי הגוף באמצעות אבחנות וטיפול.

הבדיקה מתבצעת בעזרת קולונוסקופ – צינור גמיש בעובי אצבע הבני מסייעים אופטיים שבקצתו מקור אור ומצלמת וידאו צעירה המאפשרת לבדוק הסתכלות ישירה לתוך המעי. עובי הקולונוסקופ כאצבע והוא מוחדר דרך פי הטבעת.

לעתים מתבצעות במהלך הבדיקה פעולות כמו לקיחת ביופסיה או כריית פוליפ.

לפני ביצוע בדיקת קולונוסקופיה יש לדוחו לרופא:

- אם את/ה אלרגי/ת לתרופות.
- אם יש לך מסתם לב מלאכותי.
- אם את/ה נוטל/ת אנטיביוטיקה לפני פעולה פולשנית.
- במידה ואת/ה חולה במחלת כליותית, חובה לה提יעץ עם רופא לגבי חומר ההכנה.

מדלי דם / תרופות נוגדות קריישה:

אם את/ה נוטל/ת תרופות נוגדות קריישה / מדלי דם (למשל: קוומדין (COUMADIN®), סינטרום (SINTROM®), פלביקס (PLAVIX®), קסרלטו (XARELTO®), אפינט (EFFIENT®) ודומיהם), יש להתייעץ ולשקל עם רופא את הפסיקן או מתן טיפול חילופי שיאפשר כרייתת ממצאים באנדוסקופיה.

ביצוע בדיקת קולונוסקופיה תוך המשך טיפול מדלי דם יכול להתבצע ללא כרייתת ממצאים / נטילת ביופסיות דרך האנדוסקופ.

لتשומת ליבך,

אם המעי אין נקי לחלוטין, אין אפשרות לבצע את הבדיקה.

על מנת להצליח לבצע את הבדיקה, יש צורר בניקוי המעיים באופן יסודי.

ניקוי המעיים מתבצע על ידי דיאטה דלת תאית (הכנה תזונתית) שמטרתה להפחית שאריות במעי ועל ידי מתן תרופות (כדורים משלשלים) שמטרתן ניקוי המעיים.

הנחיות להכנה לבדיקה

הכנה תזונתית לקולונוסקופיה:

מותר לאכול	אסור לאכול	
לחם לבן, פיתה, בוגט, קרקרים מקמח לבן, פסטות, אטריות מקמח לבן, עוף, הודו, דגים. כל מוצר חלב ללא חתיכות פרי, מיצים טבעיים מסוננים. ביצים, מרק צח ללא ירקות, ג'לי, עוגות ללא פירות. שתייה – קפה, חלב, משקאות דיאט.	פירות, ירקות, ציתים, אבוקדו, דגניים עם סיבים, לחם שחור, לחם ח', לחם מלא, כווסמת, שיבולת שעל, בורגול, גראנולה, סיבי חיטה, תירס. קטניות – אפונה, שעועית, עדשים, חומוס. פייצוחים – גרעינים, שקדים, בוטנים, שומשים, פיסטוקים. בשר אדם.	3 ימים לפני הבדיקה
נוזלים צלולים בלבד: מרקים צלולים, תה, מיצים, ג'לי (לא בצבע אדום).	אסור לאכול כל אוכל מוצק ומוצר חלב למיניהם.	24 שעות לפני הבדיקה
	צום מוחלט, ללא,nozleim.	3 שעות לפני הבדיקה

* חשוב! במידה והנתק מבצע/ת גם בדיקת גסטרוסקופיה, עליך להיות בצום 6 שעות לפני הבדיקה.

הכנה רפואיית לקולונוסקופיה:

לצורך רכישת התרופות להכנה, יש לגשת לרופא המשפחה לצורך קבלת מרשם עבור:

- טבליות משלשות: PO Tab. Bisacodyl 5mg (LAXADIN® / ATZIRUT®) – 6 Tablets
- PO Pwd. for Solution 16.1g PICO-SALAX® - 2 Sachets
- אבקת פיקו-סלקס: (X®)

אופן Nutzung התרופות:

- **3 ימים לפני הבדיקה:**

בשעה 20:00 יש ליטול 2 טבליות משלשות (X®).

- **2 ימים לפני הבדיקה:**

בשעה 20:00 יש ליטול 2 טבליות משלשות (X®).

- **1 יום לפני הבדיקה:**

– יש להתחיל לשתו את תמיסת ה – (X® PICOSALAX) לפי לוח-זמן המפורט. במקביל, יש להפסיק לאכול ולעבור רק לשתייה צלולה.

– בשעה 12:00 בצהרים – יש ליטול את השקיית הראשונה.

– בשעה 20:00 בערב – יש ליטול את השקיית השנייה.

– בשעה 20:00 יש ליטול 2 טבליות משלשות (X®).

הוראות הנקה ונטילת ה - PICOSALAX®

- מלאי ספל במים קרים (כ - 150 מ"ל) ורוקן/ אליה תחולת שkeit אחת.
- ערבי/ במשך 3-2 דקות עד המסה מלאה ושתה/ את התמיisha הצלולה.
- עליך לשותות בין 1.5-2 ליטר מים או נוזלים צלולים במשך 4 שעות לאחר נטילת כל שkeit.
- יש לשותות רק נוזלים צלולים – מים, סודה, ללא חלב, משקאות תוססים (לא צבע), תה צמחיים / פירות, מרק צח.

הנחיות ליום הבדיקה:

- נא הצעיד/ בטעודה מזהה ובהתchyבות מקופת חולים (מבוטחי מכבי פטורים מההתchyבות).
- חובה הגיע עם מלאו שיקח אותו הביתה לאחר הבדיקה מאחר ותהייה/ מטוושתשת במהלך הבדיקה ומספר שעות אחרת. נהיגה וכל פעילות אחרת הדורשת ערנות אסורה לאחר הבדיקה ובמשך כל היום.
- יש להפסיק לשותות 3 שעות לפני מועד הבדיקה. המשמעות, צום מוחלט 3 שעות לפני הבדיקה.
- במידה והנך סובל/ת מלץ דם גבוה או מחלת לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות עד 3 שעות לפני הבדיקה.
- לחולי סוכרת, אסור לקחת תרופות לסוכרת ואסור להזריק אינסולין בבוקר יומם הבדיקה אך יש להביא אינסולין ואת כרטיס המעקב לבדיקה עצמה.
- אני לבשי/ בגד נוח והשתדל/ להגיע ללא תכשיטים.
- לקרהת הבדיקה, תתקבש/ לחתום על טופס הסכמה על פי חוק, חתימתך על ההסכם היא תנאי הכרחי לביצוע הבדיקה.
- **חשוב!** במידה והנך מבצע/ת גם בדיקת גסטרוסקופיה, עליך להיות בזום 6 שעות לפני הבדיקה.

מהלך הבדיקה:

משך הבדיקה כ- 30-20 דקות.

על מנת להפחית את תחושת חוסר הנוחות בזמן הבדיקה, תינטן לר' זריקת טשטוש לתוך הוריד .
השהיה במקוון תיארך לפחות שעה לאחר סיום הפעולה (במידה והבדיקה בוצעה תחת טשטוש).
לאחר הבדיקה תישאר/ להשגחה במקוון גסטרו עד להתאוששות (זמן ההתאוששות שונה מאדם לאדם).
בתום ההתאוששות, תקבל/י תשובה מודפסת מהרופא שביצע את הבדיקה.
אם נלקחו ביופסיות, התוצאות תימסRNA לאחר כחודש ימים לרופא המטפל או לגסטרואנטרולוג.

תופעות לאחר הבדיקה שמחייבים התיחסות רפואי:

במידה ומופיעות אחת מהתופעות הבאות לאחר הבדיקה, יש לפנות לטיעון רפואי באופן מיידי.

- כאבים עזים בחזה או בבטן.
- עליית חום וצמרמות כיממה לאחר הבדיקה.
- דם בצואה בכמות גדולה.

אנו עושים את מירב המאמצים לעמוד במידע זימוני התורים כפי שתואמו מוחרך לך לעתים, בשל אילוצים לא צפויים, התור מתעכב ועל כך אנו מתנצלים מראש.

ברכת רפואה שלמה,
צוות מכון גסטרה